Cáncer de pulmón

Signos y síntomas

Los síntomas, en general, para ambos tipos de cáncer de pulmón (microcítico y no microcítico), a menudo aparecen de forma tardía.

Ya que los diagnósticos tempranos suelen tener o cursar con poca sintomatología o encontrarse de manera casual en una revisión médica.

Por regla general, en el momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón se encuentran en una fase avanzada de la enfermedad, y suelen presentar metástasis.

Los síntomas del **cáncer de pulmón** son los siguientes:

- Disminución de peso
- Tos con sangre o expectoración, o expulsión de sangre o moco sanguinolento
- Disnea (ahogo o dificultad para respirar)
- Dolor torácico
- Disfonía (cambio de tonalidad de la voz)
- Disfagia (dificultad para tragar)

Cuando el tumor está en una fase avanzada, como suele ser el caso del cáncer de pulmón, pueden aparecer otros síntomas como: ***cansancio, pérdida de apetito, dolores de huesos, debilidad, confusión o mareos.***

Tipos de cáncer

Por otro lado, existe también otro tipo de clasificación para englobar los síntomas de los diferentes tipos de cáncer de pulmón en tres categorías:

Síntomas locorregionales que se producen debido al crecimiento del tumor dentro del pulmón:
Tos seca o productiva que puede expulsar mucosa infectada o sangre; disnea (ahogo o dificultad para respirar) normalmente tras realizar un gran esfuerzo o pequeñas actividades físicas; disfonía disfagia dolor respiración profunda y las infecciones respiratorias frecuentes y repetidas.

Síntomas paraneoplásicos, no es producido por el tumor sino por la liberación de alguna sustancia o la activación del sistema inmune. El más común es el síndrome constitucional o lo que es lo mismo la suma de estos síntomas: cansancio, pérdida de apetito o de peso y la hipercalcemia tumoral que puede provocar entre otros síntomas náuseas, vómitos, estreñimiento o deshidratación.

Síntomas provocados o derivados a la metástasis:
Dolor sordo y continuo sobre todo en la columna vertebral.

Es importante acudir al médico en cuanto aparezcan estos síntomas o cuando se nota algo raro o inusual.

A pesar de que no existe ningún protocolo en la actualidad para detectar el cáncer de pilmón de forma temprana, según se publicó en un estudio realizado por el Programa Internacional de Acción Precoz frente al Cáncer Pulmonar (IELCAP), la realización de un TAC anual en población de riesgo podría aumentar la supervivencia de esta enfermedad a 10 años hasta en un 80% de pacientes.

Regresar al inicio

Referencias
https://rochepacientes.es/cancer/pulmon/sintomas.html

Asociación Española contra el cáncer - Síntomas del cáncer de pulmón
https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-pulmon/sintomas-cancer-pulmon

Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) - Decálogo sobre el cáncer de pulmón
http://afectadoscancerdepulmon.com/ decalogo-sobre-el-cancer-de-pulmon/#5

Clínica Universidad de Navarra
https://www.cun.es/actualidad/noticias/ congreso-internacional-resultados-tac-baja-radiacion-ielcap

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) - Cribado de cáncer de pulmón
https://www.separ.es/node/1508

Material creado por Roche
Este material/programa no tiene como fin condicionar la prescripción, el uso, la promoción, la venta, la recomendación, la indicación o la aprobación de ningún producto de Roche ni ninguna concesión de beneficios a Roche.
No tome el medicamento por su cuenta.

Siga exactamente las instrucciones de su médico. Todos los derechos reservados - la reproducción total o parcial está prohibida sin la autorización previa de Roche Servicios S.A

M-CCAV-00000103